



Dow AgroSciences

Curathane™ 72 WP

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - DITIOCARBAMATO, UREA MANCOZEB, CYMOXANIL

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS**

Composición química:

	p/p
Manganeso ethylenebis (dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt	64,00 %
1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea	8,00 %
Ingredientes inertes	28,00 %
Total.....	100,00 %

Contiene: 720 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE.

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



FABRICADO Y FORMULADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia, S.A.

Carrera 50 No. 13-209. Soledad, Atlántico, Colombia. Teléfonos: 375-9300 / 018000916012

® ™ Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

Curathane™ 72 WP

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - DITIOCARBAMATO, UREA MANCOZEB, CYMOXANIL

USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

Curathane™ 72 WP es un fungicida protectante y sistémico que actúa combinando la acción del mancozeb y el cymoxanil. El mancozeb inhibe el desarrollo del tubo germinativo de la espora ya que ocasiona una deficiencia de ATP en la célula del hongo. El cymoxanil posee acción fungicida sistémica, acropétala y acción translaminar siendo absorbido rápidamente por vía foliar por la planta (menos de 1 hora).

EQUIPO DE APLICACIÓN:

El equipo de aplicación puede ser bomba de espalda tipo manual o de motor y equipo adaptado a la toma de fuerza del tractor. El volumen de caldo a usar es de alrededor 400 litros por hectárea (280 L/mz).

Observe que el equipo de aplicación esté en condiciones adecuadas de uso.

Debe usar guantes y botas de hule durante el lavado del equipo de aplicación.


Deseche las aguas de lavado en un hueco lejos de fuentes de agua superficiales y subterráneas.

Asegúrese que las boquillas y empaques del equipo estén en buenas condiciones y que no goteen.

Este producto no daña el equipo de ningún modo.

Utilice boquillas de cono hueco, calibre el equipo usando agua.

El equipo de aplicación y los utensilios empleados en la mezcla y la aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo.




FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de aplicación con agua hasta la mitad del volumen a aplicar, mida exactamente la dosis de **Curathane™ 72 WP** y agréguela, agite y complete el volumen de agua a usar. Para dosificar la cantidad correcta de producto debe utilizar una balanza o copa de medida.

Si va a usar otros plaguicidas en mezcla debe realizar una premezcla.

Agite bien el producto en su envase previo a realizar la mezcla.





Dow AgroSciences

Curathane™ 72 WP

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - DITIOCARBAMATO, UREA MANCOZEB, CYMOXANIL

RECOMENDACIONES DE USO:

Los siguiente cultivos listados son los aprobados para uso de **Curathane™ 72 WP** en los siguientes países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
PAPA <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> Tizón temprano <i>Alternaria solani</i>	2-3 kg/ha (1,4 - 2,1 kg/mz)

Para República Dominicana:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
TOMATE <i>Lycopersicum esculentum</i>	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> Tizón temprano <i>Alternaria solani</i>	2-3 kg/ha

MOMENTO DE APLICACIÓN:

Empezar las aplicaciones con los primeros indicios de la enfermedad.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Dependiendo de la presencia del hongo y de las condiciones climáticas efectuar aplicaciones calendarizadas de 10-14 días entre aplicaciones.

INTERVALO ENTRE ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

14 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Las áreas tratadas con **Curathane™ 72 WP** pueden ser inspeccionadas 24 horas después de efectuada la aplicación. Si va en mezcla con otro agroquímico ver en su panfleto la restricción correspondiente.

FITOTOXICIDAD:

Curathane™ 72 WP no es fitotóxico a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de productos utilizados en la agricultura. Se recomienda realizar la premezcla en agua con los productos a utilizar. Es incompatible con productos de reacción alcalina como caldo bordes.

Curathane™ 72 WP

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - DITIOCARBAMATO, UREA MANCOZEB, CYMOXANIL

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No se transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico y pecuario en general.

Almacénese en su envase original con su etiqueta y panfleto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y en un ambiente fresco y seco, alejado del calor.

Los residuos sin usar deben guardarse en su envase original debidamente cerrado y procurando que su etiqueta se encuentre bien adherida.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO O APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Se presentan irritaciones en la garganta. El contacto repetido o prolongado con la piel puede causar ligera irritación. La inhalación de vapores o de la neblina de aspersion puede causar dolor de cabeza y náuseas. El contacto con los ojos puede causar irritación.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Haga que la persona beba un vaso de agua si es que puede tragarla. No induzca el vómito si no está recomendado en la etiqueta. Nuca administre nada por la boca cuando la persona se encuentra insonsciente.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón.

POR INHALACIÓN: Retire a la persona afectada del área contaminada a una de mayor ventilación y manténgala en reposo.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese durante 15 minutos con abundante agua limpia.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información Toxicológica. Centro de Intoxicaciones.	(502) 2230-0807 (502) 2232-0735
Belice	Unidad de Epidemiología.	(501) 223-1639
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	(504) 2232-2322
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 ext. 17
Costa Rica	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones.	(506) 2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos.	(507) 523-4948 (507) 523-4968
República Dominicana	Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan) Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello	(809) 684-3478/3672 (809) 681-7828

Curathane™ 72 WP

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - DITIOCARBAMATO, UREA MANCOZEB, CYMOXANIL

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

**CONSULTE AL PROFESIONAL
EN CIENCIAS AGRÍCOLAS, ANTES DE
COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.**

**PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS
RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.**

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES
CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES
O EMPAQUES VACÍOS.**

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y dépositelos en un recipiente hermético; entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES
EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO
LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente, no se responsabilizan por el mal uso que se le dé o sea diferente al estipulado en este panfleto y etiqueta.

PAÍS	No. DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	479-50	28-06-2001
BELICE		
EL SALVADOR	479-50	17-06-2009
HONDURAS	236-118-II	06-06-2001
COSTA RICA	4347	31-05-1999
PANAMÁ	1150	29-07-1999
REP. DOMINICANA	2058	14-08-2000