

# Rally™ 40 WP

**Etiqueta Web - Centroamérica**

**FUNGICIDA - TRIAZOL MYCLOBUTANIL**

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS**

**Composición química:**

	p/p
(RS)-2-(4-chlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile.....	40,00 %
Ingredientes inertes.....	60,00 %
Total.....	100,00 %

**Contiene:** 400 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

## PRECAUCIÓN

**ANTÍDOTO: NO TIENE.**

**DENSIDAD:** 1,13 g/mL a 20 °C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.  
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,  
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



**FABRICADO Y FORMULADO POR:**

Dow AgroSciences de LLC,  
Gowan Milling 12300 E County 8th Street Yuma, Arizona 85365, Estados Unidos.  
Teléfono: 928-317-5864

®™ Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

# Rally™ 40 WP

## Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - TRIAZOL MYCLOBUTANIL

### USO AGRONÓMICO

#### MODO DE ACCIÓN:

Protectante y sistémico, inhibiendo la biosíntesis de ergosterol.

#### EQUIPO DE APLICACIÓN:

Durante el uso y manejo de **Rally™ 40 WP**, use el equipo de protección consistente de anteojos, mascarilla, guantes, botas de hule y overol de mangas largas. No coma, beba o fume durante el manejo y aplicación de este producto. Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento. Antes de usar **Rally™ 40 WP**, calibre con agua el equipo de aspersión, para verificar que está aplicando el volumen referido. **Rally™ 40 WP** puede ser aplicado con cualquier tipo de boquilla y equipo de aplicación terrestre.



#### FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Al preparar la mezcla llene el tanque a la mitad con agua limpia y vierta la dosis recomendada de **Rally™ 40 WP** que va a utilizar y mézclelo, posteriormente complete el agua a utilizar. Si utiliza mezclas con **Rally™ 40 WP** con otros plaguicidas haga premezclas por separado y luego vierta al tanque la mezcla. Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo con el tanque de la aspersora, debe utilizar una balanza o copa de medida de 25 cc. Después de la aplicación lave el equipo de protección y el equipo de aplicación, báñese bien con agua y jabón y póngase ropa limpia. La ropa utilizada no deberá usarla sin ser previamente lavada.



# Rally™ 40 WP

## Etiqueta Web - Centroamérica

**FUNGICIDA - TRIAZOL MYCLOBUTANIL**

**RECOMENDACIONES DE USO:**

PAÍS	CULTIVO	PLAGAS A CONTROLAR	DOSIS RECOMENDADA	RECOMENDACIONES
Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá.	MELÓN <i>Cucumis melo</i> SANDÍA <i>Citrullus vulgaris</i>	Mildiú polvoso, <i>Erysiphe</i> sp., <i>Sphaeroteca</i> sp.; Gomosis, <i>Mycosphaerella</i> spp.	130 - 190 g/ha	Aplique al aparecer los primeros síntomas de la enfermedad. Utilice un volumen de 150 a 200 L por hectárea asegurando una buena cobertura del follaje.
	MANZANA <i>Malus plumila</i>	Roña, <i>Venturia inaequalis</i> ; Cenicilla, <i>Podosphaera leucotricha</i>	12 - 15 g / 100 L de agua	Aplique al detectar los primeros síntomas de la enfermedad y repita cada 14 días. En uvas inicie las aplicaciones antes de la floración en plantaciones muy afectadas. Utilice un volumen de 300 a 600 litros por hectárea asegurando una buena cobertura del follaje.
	UVA <i>Vitis vinifera</i>	Cenicilla, <i>Uncinula necator</i>		
	ROSAS <i>Rosa</i> spp.	Mancha negra, <i>Diplocarpon rosae</i> ; Mildiú polvoriento, <i>Sphaerotheca pannosa</i>	150 - 200 g/ha	
	PLANTAS ORNAMENTALES	Mildiú polvoriento, <i>Erysiphe</i> spp.; Mancha de la hoja, <i>Cercospora</i> spp.		
	BANANO <i>Musa</i> spp.	Pudrición de la corona, <i>Cephalosporium</i> spp., <i>Verticillium theobromae</i> , <i>Fusarium roseum</i> , <i>Fusarium moniliforme</i> , <i>Botryodiplodia theobromae</i> , <i>Glomerella cingulata</i> , <i>Thielaviopsis paradoxa</i>	1,25 - 2,12 g /100 litros de agua.	Aplicar antes del empaque de la fruta. Varíe la dosis según la presión de la enfermedad. Acompañe la mezcla con alumbre a razón de 10 gramos por litro de agua.
Nicaragua, Costa Rica, Panamá.	ARROZ <i>Oryza sativa</i>	Mancha del grano, <i>Helmithosporium oryzae</i> , <i>Sarocladium oryzae</i>	100 - 120 g/ha	Aplique 2 veces, la primera aplicación 95 días después de la siembra y la segunda 102 días después. Utilice un volumen de 150 a 220 litros por hectárea asegurando una buena cobertura.
Panamá.	CUCURBITÁCEAS	Mildiú polvoso, <i>Erysiphe</i> sp., <i>Sphaeroteca</i> sp.; Gomosis, <i>Mycosphaerella</i> spp.	100 - 120 g/ha	Aplique al aparecer los primeros síntomas de la enfermedad. Asegure una buena cobertura del follaje.
Guatemala.	ARVEJA CHINA <i>Pisum sativum</i> EJOTE FRANCÉS <i>Phaseolus vulgaris</i>	Antracnosis, <i>Erysiphe pisi</i>	160 - 240 g/ha	Iniciar aspersiones de <b>Rally™ 40 WP</b> al observar los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar dos aplicaciones con intervalo de 7 a 12 días entre una y otra.

# Rally™ 40 WP

## Etiqueta Web - Centroamérica

### FUNGICIDA - TRIAZOL MYCLOBUTANIL

PAÍS	CULTIVO	PLAGAS A CONTROLAR	DOSIS RECOMENDADA	RECOMENDACIONES
Guatemala, Honduras.	CEBOLLA <i>Allium sp.</i>	Tizon temprano, <i>Alternaria spp.</i>	150 - 180 g/ha.	Al aparecer los primeros síntomas de la enfermedad. Utilice un volumen de agua (350 - 500 L/ha) adecuado que garantice una buena cobertura del follaje.
	ZANAHORIA <i>Daucus carota</i>	Tizon temprano, <i>Alternaria dauci</i>	2 - 3 sobres de 30 g en 200 L de agua.	
	MAÍZ <i>Zea mays</i>	Mancha de asfalto, <i>Phyllachora maydis</i>	200 g/ha	Aplique en las primeras apariciones de la enfermedad, con un máximo de 2 aplicaciones. Se recomienda utilizar 300 L de agua/ha con un intervalo de aplicación de 14 días.
	CALABAZA <i>Cucurbita pepo</i>	Mildiu polvoso, <i>Erysiphe sp. Sphaeroteca sp.</i> ; Gomosis, <i>Mycosphaerella spp.</i>	130 - 190 g/ha	Aplique al aparecer los primeros síntomas de la enfermedad. Utilice un volumen de 150 a 200 L por hectárea asegurando una buena cobertura del follaje.
República Dominicana.	ARROZ <i>Oryza sativa</i>	Mancha del grano, <i>Helmithosporium oryzae</i>	150 - 200 g/ha	
	MELÓN/ PEPINO <i>Cucumis spp.</i>	Mildeo polvoso, <i>Erysiphe sp.</i> ; Antracnosis, <i>Colletotrichum lagenarium</i> ; Roña, <i>Cladosporium cucumerinum</i> ; Tizón del tallo, <i>Mycosphaerella citrulina</i> .	150 - 200 g/ha	
	BANANO <i>Musa paradisiaca</i>	Pudrición de la corona, <i>Cephalosporium spp.</i> , <i>Verticillium theobromae</i> , <i>Fusarium roseum</i> , <i>Fusarium moniliforme</i> , <i>Botryodiplodia theobromae</i> , <i>Glomerella cingulata</i> , <i>Thielaviopsis paradoxa</i> .	150 mg/L de agua	
	UVA <i>Vitis vinifera</i>	Cenicilla, <i>Uncinula necator</i> .	150 - 200 g/ha	
	ROSAS <i>Rosa spp.</i>	Mancha negra, <i>Diplocarpon rosae</i> ; Mildew polvoriento, <i>Sphaerotheca</i>	150 - 200 g/ha	
	PLANTAS ORNAMENTALES	Mildeo polvoriento, <i>Erysiphe spp.</i> ; Mancha de la hoja, <i>Cercospora spp.</i>	150 - 200 g/ha	
Belice	PAPAYA <i>Carica papaya</i>	Antracnosis, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	700 g/ha	Aplique al aparecer los primeros síntomas de la enfermedad. Utilice un volumen adecuado de aplicación que garantice un mojado adecuado de la fruta.

# Rally™ 40 WP

## Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - TRIAZOL MYCLOBUTANIL

### INTERVALO DE APLICACIÓN:

Para cultivos de manzana, rosas y plantas ornamentales, aplique al detectar los primeros síntomas de la enfermedad y repita cada 14 días. En uvas, inicie las aplicaciones antes de la floración en plantaciones muy afectadas. Repita cada 15 a 20 días, hasta 3 días antes de la cosecha, utilizando volúmenes de agua de 1.000 a 1.500 litros/hectárea. En cucurbitáceas hacer unas 2 aplicaciones en el ciclo, separadas entre sí unos 7-10 días, al aparecer los primeros signos de la enfermedad. En arroz aplique a la emisión de la espiga y/o 10 a 14 días después. En cebolla y zanahoria aplicar al aparecer los primeros síntomas de la enfermedad. En maíz se aplica 2 veces con un intervalo de 14 días.

### INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

15 días en uvas, manzanas, papaya, ornamentales y rosas no hay restricción. En cucurbitáceas hasta 7 días antes de la cosecha. En banano la aplicación es en post-cosecha, durante el empaque de la fruta. En arroz aplique hasta 21 días antes de la cosecha. En cebolla y zanahoria las aplicaciones pueden realizarse hasta incluso el mismo día de la cosecha. En arveja china, ejote francés y maíz 1 día antes de la cosecha.

### INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

24 horas en todos los cultivos.

### FITOTOXICIDAD:

No se presenta fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

### COMPATIBILIDAD:

Rally™ 40 WP es compatible con la mayoría de los plaguicidas existentes en el mercado, se recomienda realizar la premezcla en agua con los productos a utilizar.

# Rally™ 40 WP

## Etiqueta Web - Centroamérica

**FUNGICIDA - TRIAZOL MYCLOBUTANIL**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

No almacene este producto en casas de habitación. Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacénelo bajo llave en un lugar seco, ventilado. No lo transporte ni lo almacene junto con alimentos, medicinas, ni con utensilios de uso personal. Manténgase el producto cerrado, bien etiquetado, con su panfleto y en su envase original. No es inflamable ni corrosivo a los metales.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO O APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:**

Puede causar irritación en la nariz, garganta y vías respiratorias. Así mismo puede causar irritación de los ojos y la piel.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**POR INGESTIÓN:** Haga que la persona beba un vaso de agua si es que puede tragarla. No induzca el vómito a menos que sea indicado por el médico o el centro de control de intoxicaciones. Nunca administre nada por la boca cuando la persona se encuentra inconsciente.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Quite las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

**POR INHALACIÓN:** Retire a la persona afectada del área contaminada a una de mayor ventilación y manténgala en reposo. Si es necesario administre respiración artificial.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Lave la parte afectada por espacio de 15 minutos con agua limpia.

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

**ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:**

Este producto no tiene antídoto. Usar tratamiento médico sintomático.

**CENTROS INTERNACIONALES DE INTOXICACIÓN**

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información Toxicológica. Centro de Intoxicaciones.	(502) 2230-0807 (502) 2232-0735
Belice	Unidad de Epidemiología.	(501) 223-1639
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	(504) 2232-2322
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 ext. 1294 (505) 8755-0983
Costa Rica	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones.	(506) 2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos.	(507) 523-4948 (507) 523-4968
República Dominicana	Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan) Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello	(809) 684-3478/3672 (809) 681-7828



# Rally™ 40 WP

## Etiqueta Web - Centroamérica

**FUNGICIDA - TRIAZOL MYCLOBUTANIL**

**CONSULTE AL PROFESIONAL  
EN CIENCIAS AGRÍCOLAS, ANTES DE  
COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.**

**PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS  
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS  
RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.**

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

**TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.**



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES  
CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES  
O EMPAQUES VACÍOS.**

No lo aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas.

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES,  
DESECHOS Y REMANENTES:**

En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y deposítelos en un recipiente hermético; entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES  
EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE  
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO  
LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

**AVISO DE GARANTÍA:**

El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabilizan por el mal uso que se le dé o sea diferente al estipulado en este panfleto y en la etiqueta.

PAÍS	No. DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
BELICE	0335-1	15-12-2010
GUATEMALA	479-69	28-06-2001
EL SALVADOR	3485	20-07-2012
HONDURAS	165-83-II	06-06-2001
NICARAGUA	DOW-001-4-2006	28-11-2006
COSTA RICA	3485	15-11-1993
PANAMÁ	1008	19-04-1999
REP. DOMINICANA	2373	15-11-2003