



# ZORVEC® ENCANTIA® 33 SE

FUNGICIDA – PIPERIDINYL THIAZOLE ISOXAZOLINE, OXAZOLE  
OXATHIPIPROLIN, FAMOXADONE

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO,  
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS

## Composición Química:

	%m/v
1-(4-(4-[(5RS)-5-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl)-1-piperidyl)-2-[5-methyl-3 (trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanone .....	3,00
(RS)-3-anilino-5-methyl-5-(4-phenoxyphenyl)-1,3-oxazolidione-2,4-dione .....	30,00
Ingredientes Inertes .....	74,00

**Contiene:** 330 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

**DENSIDAD:** 1,07 g/mL a 20 °C

## ATENCIÓN

EN CASO DE INTOXICACIÓN TRASLADAR AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO  
Y ENTREGUE LA ETIQUETA Y EL PANFLETO

## ANTÍDOTO: NO TIENE

### FORMULADOR:

**Corteva Agriscience LLC.**

9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268,  
Estados Unidos. Tel. +1 317 337 3000.

### REGISTRANTE:

**Agro Solutions, S.R.L.**

Calle Miguel Ángel Garrido No 11 Ensanche, Los Prados,  
Santo Domingo, República Dominicana.

™ Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © Corteva

# ZORVEC® ENCANTIA® 33 SE

FUNGICIDA – PIPERIDINYL THIAZOLE ISOXAZOLINE, OXAZOLE  
OXATHIPIPROLIN, FAMOXADONE

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA  
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN**

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN**



**MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS,  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES,  
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS**

**USO AGRONÓMICO:** Fungicida de uso agrícola.

**MODO Y MÉCANISMO DE ACCIÓN:** Zorvec® Encantia® 33 SE es un fungicida con un mecanismo de acción nuevo, de acuerdo a FRAC, oxathiapirolin, pertenece al grupo 49, inhibición de la proteína de unión oxysterol (OSBP) y famoxadona pertenece al grupo C3 complejo III: citocromo bc1 (ubiquinol oxidasa) en el sitio Qo (gen cyt b). Sin resistencia cruzada (oxathiapirolin) con los fungicidas presentes en el mercado. Zorvec® Encantia® 33 SE es un fungicida con efecto residual y con movimiento sistémico translaminar y acropétalo (movimiento ascendente) dentro de los tejidos de las plantas tratadas. Debido a su capacidad sistémica ascendente, protege también a los nuevos brotes en el intervalo de aplicación en que se utiliza y por esta razón, se recomienda principalmente en el periodo de mayor crecimiento vegetativo de los cultivos.

**EQUIPO DE APLICACIÓN:** Tomando en consideración que el producto tiene movimiento sistémico acropétalo (movimiento ascendente), que permite una cobertura uniforme del follaje y la protección del lavado por lluvias, independiente del equipo de aplicación utilizado, con la finalidad de asegurar el control de la enfermedad durante el periodo especificado en el cuadro de recomendaciones. Por esto, utilice la presión en su equipo de aplicación recomendada por el fabricante y el volumen de agua de acuerdo al cuadro de recomendaciones. Utilice boquillas que estén diseñadas para el tipo de aplicación en cuestión.

Para la mayoría de los tipos de boquillas, a medida que el ángulo de aspersión es menor, mayor será el tamaño de gota. Considere la utilización de boquillas de baja deriva.

LAVE EL EQUIPO DE APLICACIÓN ANTES Y DESPUÉS DE USARLO. APLIQUE EL PRODUCTO, UTILIZANDO EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



**FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** Antes de aplicar Zorvec® Encantia® 33 SE asegúrese de que el equipo de aplicación esté limpio y libre de depósitos de plaguicidas de la aplicación anterior.

**pH del agua:** Se recomienda el uso de agua de buena calidad especialmente con bajo grado de durezas y un pH balanceado (6.5 - 7).

- Calibre el equipo de aplicación lejos de fuentes de agua, utilizando únicamente agua limpia.
- Revise el equipo de aplicación regularmente.
- Asegúrese que todos los usuarios/empleados midan los plaguicidas debidamente.
- Mezcle solamente la cantidad de producto necesaria para la superficie a tratar.
- No llene en exceso el tanque del equipo de aplicación.
- No descargue los sobrantes en el suelo, ni en un sólo lugar en el campo tratado, ni en el lugar donde mezcla y carga la aspersora.
- Diluya y agite el sobrante, aplicándolo según los usos y dosis de esta etiqueta.



# ZORVEC® ENCANTIA® 33 SE

FUNGICIDA – PIPERIDINYL THIAZOLE ISOXAZOLINE, OXAZOLE OXATHIPIPROLIN, FAMOXADONE

## RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Papa, <i>Solanum tuberosum</i> Tomate, <i>Solanum lycopersicum</i>	Tizón tardío, <i>Phytophthora infestans</i>	500 mL/ha	<p>Realice 2 aplicaciones en bloque (consecutivas) y alterne con 1 o 2 aplicaciones de un fungicida con diferente mecanismo de acción antes de hacer la tercera aplicación de <b>Zorvec® Encantia® 33 SE</b>.</p> <p>No realice más de 3 aplicaciones de <b>Zorvec® Encantia® 33 SE</b> por ciclo de cultivo.</p> <p>Para papa, utilice un volumen de agua aproximado de 350 - 500 L/ha. Para tomate, utilice un volumen de agua aproximado de 350 - 600 L/ha.</p>
Ají, <i>Capsicum annuum</i>	Secadora o Marchitez, <i>Phytophthora capsici</i>	20 - 30 mL / 1,000 plantas	Realizar una aplicación al tallo de la planta 1 día después del trasplante. Utilizar un promedio de 40 mL de mezcla / planta. Cantidad máxima de producto por ciclo de cultivo: 900 mL/ha.

Realice máximo el 33% del número total de aplicaciones. Para papa y tomate no realice más de 2 aplicaciones en bloque (consecutivas) antes de alternar con otro fungicida con diferente mecanismo de acción. Las aplicaciones de **Zorvec® Encantia® 33 SE** deben realizarse de forma preventiva (estrictamente necesario). Cuando se realicen menos de 3 aplicaciones de fungicidas, no realice más de 1 aplicación de **Zorvec® Encantia® 33 SE** (de ser posible). **Zorvec® Encantia® 33 SE** no debe usarse en la producción en viveros.

**INTERVALO DE APLICACIÓN:** En papa y tomate 7 días.

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:** Para papa 14 días. Para tomate y ají 3 días.

**INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** No entre, o permita que otras personas entren en el área aplicada, sin el adecuado equipo de protección en un lapso de 12 horas después de la aplicación.

**FITOTOXICIDAD:** El fungicida marca **Zorvec® Encantia® 33 SE** no es fitotóxico a los cultivos mencionados ni a las dosis aquí recomendadas, siempre y cuando se sigan las instrucciones incluidas en esta etiqueta.

**COMPATIBILIDAD:** No se ha probado la seguridad de los cultivos en todas las mezclas de tanque posibles, incluyendo aditivos y otros plaguicidas. Antes de aplicar una mezcla de tanque aplique a un área pequeña del cultivo objetivo de acuerdo con las recomendaciones dadas en esta etiqueta para asegurar que no ocurrirá respuesta de fitotoxicidad.

# ZORVEC® ENCANTIA® 33 SE

FUNGICIDA – PIPERIDINYL THIAZOLE ISOXAZOLINE, OXAZOLE  
OXATHIPIPROLIN, FAMOXADONE

*Manejo de resistencia:* **Zorvec® Encantia® 33 SE** contiene el ingrediente activo Oxathiapiprolin (GRUPO FRAC 49) y Famoxadona (GRUPO FRAC 11). No se recomienda usar únicamente **Zorvec® Encantia® 33 SE** u otros fungicidas de los GRUPOS 49 y 11 para controlar la misma enfermedad durante toda la temporada. Se recomienda rotar y/o mezclar con productos que tengan diferentes MoA o limitar el número total de aplicaciones por temporada. No modifique la dosis recomendada en etiqueta, ni lo use fuera del momento recomendado. Se alienta el manejo responsable de la resistencia para garantizar un control efectivo a largo plazo de las enfermedades fúngicas. **Zorvec® Encantia® 33 SE** no debe alternarse o ser mezclado con cualquier fungicida al que ya se haya desarrollado resistencia.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



**UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



## ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico y pecuario en general. Tanto en el transporte como en el almacenamiento procure que no esté el producto con ningún tipo de herbicida. Almacénese bajo llave, en un lugar fresco y seco; alejado del calor. Los residuos sin usar deben guardarse en su envase original debidamente cerrado y procurando que su etiqueta se encuentre bien adherida.

## SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Este producto puede ocasionar comezón, enrojecimiento, hinchazón en la piel. Puede ocasionar: irritación ocular, lagrimeo, visión borrosa. Si se ingiere, Puede ocasionar: función hepática anormal; formación anormal de glóbulos blancos, empañamiento del ojo.

# ZORVEC<sup>®</sup> ENCANTIA<sup>®</sup> 33 SE

**FUNGICIDA – PIPERIDINYL THIAZOLE ISOXAZOLINE, OXAZOLE OXATHIPIPROLIN, FAMOXADONE**

## PRIMEROS AUXILIOS:

**EN CASO DE INGESTIÓN:** No induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**Para Rep. Dominicana:** Suministre tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua.

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE INHALACIÓN:** Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCAN EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA**

**TRATAMIENTO MÉDICO:** Dar tratamiento sintomático.

## CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONO
República Dominicana	Hospital Dr. Luís E. Aybar. (Morgan)	(809) 684-3478 / 3672
	Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello	(809) 681-7828

## PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

**TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS**



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS**

El producto no es oxidante. Confinar el material derramado si es posible, absorber con materiales tales como: arcilla, barro, arena y barrer. Se deberá recoger en recipientes apropiados y debidamente etiquetados.



# ZORVEC® ENCANTIA® 33 SE

FUNGICIDA – PIPERIDINYL THIAZOLE ISOXAZOLINE, OXAZOLE  
OXATHIPIPROLIN, FAMOXADONE

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

#### MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS,  
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

**AVISO DE GARANTÍA:** El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabilizan por el mal uso que se le dé o sea diferente al estipulado en este panfleto y en la etiqueta.

#### FORMULADO POR:

**Corteva Agriscience LLC.**  
9330 Zionsville Road, Indianapolis,  
IN 46268-1054 Estados Unidos.  
Tel. +1 317 337 3000.

#### REGISTRANTE:

**Agro Solutions, S.R.L.**  
Calle Miguel Ángel Garrido No 11 Ensanche, Los Prados,  
Santo Domingo, República Dominicana.

#### IMPORTADOR:

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO
Rep. Dominicana	7918