

Bengala™ 25 OD

Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - SULFONAMIDA PENOX SULAM

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS**

Composición química:

Ingrediente activo:

	%p/v
Penoxsulam.....	2,5 %
Ingredientes inertes.....	97,5 %
Total.....	100,0 %

Contiene: 25 cc de ingrediente activo por litro de producto formulado a 20 °C.

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE. El tratamiento es sintomático.

DENSIDAD: 1,61 g/mL a 20 °C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN, MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



FABRICADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia, S. A.
Transversal 18 # 96-41 Piso 7°. Bogotá, Colombia.

®™ **Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow**

Bengala™ 25 OD

Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - SULFONAMIDA PENOXSULAM

USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

Bengala™ 25 OD es un herbicida sistémico y selectivo, de acción pre y post emergente, perteneciente a la familia de las triazolopyrimidinas sulfonamidas, cuyo uso se recomienda para el control de *Echinochloa colona*, malezas de hoja ancha y ciperáceas comunes en el cultivo de arroz.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Las aplicaciones pueden ser realizadas por vía terrestre con aspersora de espalda.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Disolver completamente la cantidad de **Bengala™ 25 OD** a ser usada en un balde, luego depositarla en el tanque de mezcla que contenga agua hasta la mitad de su capacidad. Completar el volumen total de agua y agitar.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO

Arroz
Oryza sativa

MALEZAS QUE CONTROLA

Echinochloa colonom Liendrepuerco
Cyperus iria Paja cortadera

Indicaciones: Usar dosis baja para suelos con textura liviana (franco arenoso), altos niveles de humedad y bajo grado de infestación de malezas, y la dosis alta en suelos de textura pesada (franco arcillosos y limonosos) con suelo a capacidad de campo y altas poblaciones de malezas.

CULTIVO

Arroz
Oryza sativa

MALEZAS QUE CONTROLA

Echinochloa colonom Liendrepuerco
Cyperus iria Paja cortadera
Eclipta alba Botoncillo
Ludwigia linifolia Palo de agua

Indicaciones: Aplicar en post-emergencia temprana sobre malezas de 1 a 4 hojas; empleando la dosis menor cuando se presenten bajas infestaciones de malezas y la dosis mayor con altas infestaciones de malezas.



Dow AgroSciences

Bengala™ 25 OD

Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - SULFONAMIDA PENOXSULAM

DOSIS RECOMENDADA: 1,600 cc a 2,400 cc

Volumen de aplicación: Para aplicaciones aéreas utilizar un volumen de 20 galones de mezcla por hectárea. En aplicaciones terrestres utilizar volúmenes entre 100 y 200 litros de agua por hectárea.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Depende de la población de malezas.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Periodo de carencia 60 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Las personas y animales pueden reingresar a las áreas tratadas veinticuatro (24) horas después de la última aplicación.

FITOTOXICIDAD:

No fitotóxico para el cultivo del arroz, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

COMPATIBILIDAD:

No se conocen incompatibilidades físicas con los insecticidas y herbicidas de uso común en el cultivo del arroz; sin embargo es conveniente hacer una pre-mezcla antes de su utilización. **Bengala™ 25 OD** es compatible con Butaclor, Oxyfluorfen y Pendimetalina en aplicaciones pre-emergentes.

Para el manejo de complejos de malezas en post-emergencia temprana se recomienda mezclar **Bengala™ 25 OD** 1,600 cc/ha + 4 a 5 lts/ha de Stampir (Propanil + Triclopyr).

Bengala™ 25 OD

Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - SULFONAMIDA PENOXSULAM

PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIA DE USO:

Los que manipulan el producto deben usar camisas mangas largas, guantes y botas de goma. Lávese las manos antes de comer, beber, goma de mascar, fumar o usar el baño. Después de manipular este producto báñese y cámbiese de ropa.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Manténgase el empaque cerrado, en un lugar fresco y seco. Manténgase alejado del fuego. No almacene ni transporte junto a alimentos o medicinas.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Irritación de los ojos, piel y vías respiratorias.

PRIMEROS AUXILIOS:

Inhalación: Lleve la persona afectada al aire libre y manténgala en reposo.

Piel: En caso de contacto con la piel lave las partes expuestas con abundante agua y jabón.

Ojos: Lave los ojos contaminados durante 15 minutos mientras mantiene los ojos abiertos. Busque atención médica si la irritación persiste.

Ingestión: No induzca al vómito. Dele a beber grandes cantidades de agua en caso de que la persona este consciente.

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA
AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO
DE INCONSCIENCIA.**

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

El tratamiento es sintomático, no se conoce antídoto específico.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

República Dominicana	Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan)	(809) 684-3478/3672
	Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello	(809) 681-7828





Dow AgroSciences

Bengala™ 25 OD

Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - SULFONAMIDA PENOX SULAM

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

No contamine las fuentes de agua potable o de riego al lavar los equipos de aspersión o al desechar residuos del producto.

**CONSULTE AL PROFESIONAL
EN CIENCIAS AGRÍCOLAS
ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.**

**PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS. CUMPLA CON LAS
RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.**

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS



TÓXICO PARA EL GANADO



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE
PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Los desechos de pesticidas son tóxicos. Los envases vacíos y desechos deben ser eliminados en un lugar indicado por las autoridades para esos fines. Ningún empaque que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para alimentos o agua para consumo.

Los envases vacíos deben ser enjuagados tres veces, agregando un producto especial para tales fines. Envíe los envases vacíos luego de su lavado para reciclaje o perfórelos, incinérelos y si lo quema manténgase lejos del humo.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES
EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE
FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO
LA SALUD HUMANA Y DEL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente, no se responsabilizan por el mal uso que se le dé o sea diferente al estipulado en este panfleto y en la etiqueta.

PAÍSES DONDE SE ENCUENTRA REGISTRADO

PAÍS	No. REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
REP. DOMINICANA	2665	05-01-2006