

Novixid™ 3,25 OD

Etiqueta Web - Centroamérica

RINSKOR[®] ACTIVE HERBICIDA - ARYLPICOLINATO, SULFONAMIDA FLORPYRAUXIFEN - BENZYL + PENOX SULAM

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO Y LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS**

Composición química:

	% m/v
Benzyl 4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)-5-fluoropyridine-2-carboxylate	1,25
3-(2,2-difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c] pyrimidin-2-yl)- α,α,α -trifluorotoluene-2-sulfonamide ...	2,00
Ingredientes inertes	91,75

DENSIDAD: 0,95 g/mL a 20 °C

Contiene: 32,5 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



FORMULADOR:

Dow AgroSciences LLC,
9330 Zionsville Rd 308/2E Indianapolis, IN 46268-1054, USA

® ™ Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow



Dow AgroSciences

Novixid™ 3,25 OD

Etiqueta Web - Centroamérica

RINSKOR^{ACTIVE} HERBICIDA - ARYLPICOLINATO, SULFONAMIDA FLORPYRAUXIFEN - BENZYL + PENOXsulAM

USO AGRONÓMICO

Herbicida de uso agronómico.

MODO DE ACCIÓN:

Novixid™ 3,25 OD es un herbicida sistémico efectivo para el control post-emergente y residual de las principales malezas gramíneas, ciperáceas y hojas anchas de importancia económica presentes en el cultivo de arroz. **Novixid™ 3,25 OD** ofrece una adecuada selectividad al cultivo tanto en sistemas de siembra directa con semilla tapada o destapada y trasplante. Su ingrediente activo **Rinskor™ [florpyrauxifen-benzyl]** es miembro de la familia química arylpicolinato, dentro del grupo de las auxinas sintéticas y representa un modo y mecanismo de acción alternativo para uso en arroz. Su ingrediente activo Penoxsulam es miembro de la familia química de las sulfonamidas dentro del grupo de los inhibidores de la ALS.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Utilizar equipo de aplicación debidamente limpio, sin residuos de aplicaciones anteriores, calibrado, boquillas de abanico plano, presión entre 30 y 35 psi y evitar traslapes de aplicación. No utilizar equipos de aplicación que generen gotas muy finas, tipo pulverización. Conservar la franja de seguridad a los cultivos susceptibles. Se pueden utilizar equipos de aplicación terrestre (aspersora manual o tractor) y equipos de aplicación aérea.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Disolver completamente la cantidad de **Novixid™ 3,25 OD** a ser usada en un balde, luego depositarla en el tanque de mezcla que contenga agua hasta $\frac{3}{4}$ o la mitad de su capacidad. Completar el volumen total de agua y agitar. Usar correctores de pH y dureza de ser necesario.

Una vez realizada la aplicación se debe lavar el equipo adecuadamente.





Dow AgroSciences

Novixid™ 3,25 OD

Etiqueta Web - Centroamérica

RINSKOR ACTIVE HERBICIDA - ARYLPICOLINATO, SULFONAMIDA FLORPYRAUXIFEN - BENZYL + PENOX SULAM

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MALEZAS QUE CONTROLA	DOSIS RECOMENDADA	RECOMENDACIONES
ARROZ <i>Oryza sativa</i>	Pie gallo (<i>Echinochloa colona</i>) Tumba crédito (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Pelo de mico (<i>Fimbristylis miliacea</i>) Flor mora (<i>Leptochloa filiformis</i>) Cortadera (<i>Cyperus esculentus</i>) Sombrillita (<i>Cyperus iria</i>) Botoncillo, palito (<i>Eclipta alba</i>) Clavito (<i>Ludwigia linifolia</i>) Tamarindillo (<i>Aeschynomene rudis</i>) Lila (<i>Heteranthera limosa</i>) Piñita (<i>Murdannia nudiflora</i>) Suelda con suelda (<i>Commelina diffusa</i>)	2,4 L/ha	Las aplicaciones deben realizarse sobre malezas expuestas y en crecimiento activo que se encuentren en estado de desarrollo vegetativo, de 3-4 hojas para el caso de las gramíneas, 5 cm para las ciperáceas y de no más de 10 cm para las hojas anchas. Para asegurar los mejores controles aplicar Novixid™ 3,25 OD entre los 10 y 15 días después de la siembra. El lote debe ser drenado antes de la aplicación e inundado nuevamente en los 2-3 días siguientes para asegurar los mejores resultados de control.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Realizar la aplicación en post-emergencia temprana, sobre malezas de 3-4 hojas, y el arroz en estado vegetativo; con no menos de 3 hojas y sin raíces expuestas hasta antes de la formación de primordio floral. No utilizar **Novixid™ 3,25 OD** en aplicaciones tardías o de rescate.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 60 días

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Se recomienda esperar 12 horas después de la aplicación para reingresar a un campo tratado.

FITOTOXICIDAD:

Si se utiliza este producto siguiendo las recomendaciones de dosis y manejo que se incluyen en esta etiqueta, se espera que no se presenten síntomas de fitotoxicidad al cultivo y de presentarse, se espera que sean leves y transitorios.

COMPATIBILIDAD:

Evitar el contacto con materiales oxidantes. No se recomienda la mezcla de tanque con productos que contengan bispyribac-sodio, carfentrazone, quinclorac, bentazon o pyrazosulfuron ya que se puede presentar antagonismo en el control de algunas malezas o daño al cultivo. En caso de aplicaciones secuenciales con estos productos asegurar un periodo no menor a 7 días entre aplicaciones

Novixid™ 3,25 OD

Etiqueta Web - Centroamérica

RINSKOR^{ACTIVE} HERBICIDA - ARYLPICOLINATO, SULFONAMIDA FLORPYRAUXIFEN - BENZYL + PENOX SULAM

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico y pecuario en general. Tanto en el transporte como en el almacenamiento procure que no esté el producto con ningún tipo de herbicida. Almacénesse bajo llave, en un lugar fresco y seco; alejado del calor. Los residuos sin usar deben guardarse en su envase original debidamente cerrado y procurando que su etiqueta se encuentre bien adherida.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Un breve contacto puede causar una ligera irritación en la piel con enrojecimiento local. Puede producir sequedad y escamas en la piel. Puede producir una irritación moderada en los ojos. Puede producir una ligera lesión en la córnea.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o Centro de Salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto). Suministrar tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante

agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve al paciente al médico o al Centro de Salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al Centro de Salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lave los ojos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al Centro de Salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO:

Dar tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información Toxicológica.	(502) 2230-0807
	Centro de Intoxicaciones.	(502) 2232-0735
Belize	Unidad de Epidemiología.	(501) 223-1639
El Salvador	Hospital Rosales	(503) 2231-9262
	SINTOX	800-70-31
Honduras	Hospital Escuela	(504) 2232-2322
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 ext. 1294 (505) 8755-0983
Costa Rica	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones.	(506) 2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos.	(507) 523-4948 (507) 523-4968



Dow AgroSciences

Novixid™ 3,25 OD

Etiqueta Web - Centroamérica

RINSKOR^{ACTIVE} HERBICIDA - ARYLPICOLINATO, SULFONAMIDA FLORPYRAUXIFEN - BENZYL + PENOXSULAM

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
República Dominicana	Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan)	(809) 689-3478/3672
	Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello	(809) 681-7828

ANTES DE COMPRAR Y USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN LA ETIQUETA Y EL PANFLETO

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

Para el florpypauxifen-benzyl se espera que el material se biodegrade muy lentamente. El potencial de bioconcentración es moderado. Se prevé que el material sea relativamente inmóvil en el suelo. Para penoxsulam se espera que el material se biodegrade muy lentamente. El potencial de bioconcentración es bajo. El potencial de movilidad en el suelo es elevado. En caso de derrame confinar el material derramado si es posible, absorber con materiales tales como: arcilla, barro, arena y barrer. Se deberá recoger en recipientes apropiados y debidamente etiquetados.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabilizan por el mal uso que se le dé o sea diferente al estipulado en el panfleto y en la etiqueta.

PAÍS	No. DE REGISTRO
Guatemala	
Belice	
El Salvador	
Honduras	
Nicaragua	
Costa Rica	
Panamá	
Rep. Dominicana	7264